

## **TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLONOSCOPIA**

PACIENTE (NOME COMPLETO): \_\_\_\_\_

A Colonoscopia é um exame delicado, sob sedação, portanto, não marque compromissos logo após o exame. O jejum é de fundamental importância para a segurança da sedação. É fundamental realizar o preparo do cólon adequadamente, haverá diarreia. Como na maioria dos procedimentos médicos, existem riscos, que variam conforme o estado de saúde do paciente. Inclui-se algum desconforto para a punção da veia antes do exame, assim como cólicas e distensão abdominal após o exame. Há um risco muito baixo de complicações mais sérias, como sangramento, serão tomados todos os cuidados para minimizar estas possibilidades. Não será corrido nenhum risco adicional, a menos que seja absolutamente imprescindível para o bem estar e a melhora do paciente. Você será submetido(a) a sedação para fazer o exame, haverá um médico anestesiológico para assisti-lo.

O paciente **NÃO DEVERÁ** operar máquinas, **DIRIGIR**, utilizar objetos cortantes ou exercer tarefas que exijam atenção máxima nas 12 horas após o término do exame. O paciente sairá da clínica consciente e com as orientações necessárias para a sua residência. No entanto, algumas pessoas têm um pouco de sonolência após o procedimento, portanto:

**É NECESSÁRIO NO MÍNIMO UM (E NO MÁXIMO DOIS) ACOMPANHANTE(S).**

**O EXAME NÃO SERÁ REALIZADO CASO O PACIENTE NÃO TENHA ACOMPANHANTE PARA IR EMBORA.**

**Pacientes que sofrem de diabetes:** Estes devem alimentar-se bem, várias vezes ao dia, dentro das indicações dos alimentos, mesmo que se tratem de líquidos, para o preparo do exame, evitando-se a hipoglicemia, porém respeitando o período solicitado para jejum. Não tome hipoglicemiantes / insulina uma vez iniciada a tomada do laxante.

**As medicações habituais devem ser mantidas regularmente**, segundo a orientação do seu médico e da equipe médica da Endoskope. No entanto deve-se informar o médico anestesiológico, na consulta pré-anestésica ou antes do exame, a respeito delas. Anote quais são e a dose habitual nesta página, trazendo-a consigo no dia do exame.

**Não devem ser usados medicamentos contendo ácido acetil-salicílico** (AAS, Aspirina, Melhoral, Fontol, Buferin, Cibalena, Sonrisal, Engov, Doril, etc) nos 6 (seis) dias que antecedem o exame, salvo se a necessidade do exame for urgente. Marcumar, Marevar, devem ser interrompidos 5 dias antes. Nesse caso, sempre informe a enfermeira ou o médico que irá atendê-lo para que sejam tomados os cuidados necessários. Estes medicamentos atrapalham a coagulação do sangue.

**Não devem ser usados medicamentos orais para tratamento de anemia** (ferro) nos 5 (cinco) dias que antecedem o exame. Eles deixam as fezes em um tom mais escuro, atrapalhando a qualidade do preparo do intestino. Em casos de urgência do exame, favor alertar o(s) médico(s) ou enfermeira.

**Não usar relógios, jóias, bijouterias, brincos e piercings**, pois os metais atrapalham alguns procedimentos.

**Não use esmalte ou base nas unhas.** Atrapalham o funcionamento dos aparelhos para obtenção dos sinais vitais.

Caso o exame esteja sendo pago pelo próprio paciente (particular), custos adicionais eventuais como procedimentos intervencionistas e intercorrências que precisem ser manejadas pela equipe médica e pela instituição hospitalar, também deverão ser custeados pelo paciente.

Declaro que entendi claramente todas as informações a mim prestadas pela equipe do Endoskope, e as contidas neste folheto e aceito ser submetido a este exame.

---

PACIENTE OU RESPONSÁVEL

---

TESTEMUNHA

TRAGA ESTE FOLHETO DEVIDAMENTE ASSINADO NO DIA DO EXAME  
E ENTREGUE-O NA RECEPÇÃO.

-----

Concordo com a realização de procedimentos adicionais como polipectomias (cirurgia endoscópica para remoção de pólipos) e/ou biópsias, caso sejam necessárias.

( ) SIM ( ) NÃO

---

PACIENTE OU RESPONSÁVEL